



Scheda tecnica

FERSC-DT-257_IT_ST_it
rev. 01
09/2025

DELTA FER FLOW



ATTENZIONE



UFI: US30-60U9-000K-SFE1

Informazioni

- Composizione** Deltametrina (CAS 52918-63-5) 2,46 g
Tetrametrina (CAS 7696-12-0) 0,665 g
Coformulanti q.b. a 100 g
- Autorizzazione** PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO, autorizzato dal Ministero della Salute in conformità al D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998, registrazione PMC n°21565.
- Classificazione ed etichettatura (Regolamento (CE) 1272/2008)** **Indicazioni di pericolo**
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Consigli di prudenza**
P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Specifiche tecniche

- Utilizzatori** Professionisti
- Organismi target** Il prodotto è destinato alla lotta contro insetti volanti quali zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetti delle derrate (*Plodia interpunctella*); insetti striscianti quali scarafaggi (*Blatta orientalis*, *Blattella germanica*), formiche (*Lasius niger*) e zecche (*Ixodes ricinus*).
- Campi d'impiego** Il prodotto può essere utilizzato all'interno e, all'esterno, sul verde ornamentale (prati, cespugli, siepi, viali alberati) per il solo controllo delle zanzare. Igiene pubblica: abitazioni private, fabbricati ad uso civile, aree urbane e suburbane, scuole, asili, palestre, caserme, luoghi pubblici e turistici, Horeca, ospedali, case di riposo, mezzi di trasporto (esclusi aerei), stazioni. Attività produttive industriali, inclusi magazzini e locali di lavorazione degli alimenti, in assenza degli alimenti, ambienti rurali, nei ricoveri di animali domestici.
- Caratteristiche** Insetticida-acaricida liquido in sospensione concentrata (flowable) a base di deltametrina e tetrametrina, piretroidi sintetici con azione abbattente. La particolare formulazione è caratterizzata da un elevato contenuto di acqua. La sospensione di micro-particelle di principio attivo è particolarmente indicata per il trattamento di superfici porose.
- Istruzioni, modalità d'uso e dosi d'impiego** Il prodotto deve essere diluito al momento dell'uso e applicato in ragione delle dosi di applicazione riportate di seguito. La soluzione ottenuta può essere distribuita tramite pompe manuali a pressione, sistemi automatici, atomizzatori, nebulizzatori e ULV.
Per i trattamenti contro le **zanzare**, nelle aree verdi, diluire allo 0,3% (es.: 3ml in 1L di acqua), applicare 1L di prodotto diluito su 50m² di vegetazione, provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. Nelle applicazioni dirette sugli **insetti delle derrate** diluire allo 0,2% (es.: 2ml in 1L di acqua), applicare 1L di prodotto diluito ogni 20m².
Nei trattamenti superficiali contro gli **scarafaggi**, diluire allo 0,4% (es.: 4ml in 1L di acqua), applicare 1L di prodotto diluito ogni 10m². Monitorare l'infestazione a 1 settimana dal trattamento.
Nei trattamenti superficiali contro **formiche** e **zecche**, diluire allo 0,3% (es.: 3ml in 1L di acqua), applicare 1L di prodotto diluito su 20m².
- Imballaggi** Contenuto netto: 5L
Tipologie di imballaggio: tanica

Altre informazioni e avvertenze

- Conservazione** Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Non riutilizzare il contenitore.
- Validità** 2 anni.

Per avere informazioni più dettagliate, fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto e all'etichetta.

Prima dell'uso seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta.